



- Veuillez vous enregistrer au Centre Diagnostic (1^{er} étage).
- Si vous devez annuler, veuillez nous donner 24 heures d'avance.
- Si vous voyagez hors du pays après votre examen, veuillez aviser le technologue ou infirmière pour la documentation.
- Veuillez apporter tous vos médicaments avec vous. Vous recommencerez tous immédiatement après votre examen.

NOM DU PATIENT: _____ **DATE/HEURE DU RENDEZ-VOUS:** _____

Instructions pour l'examen de perfusion myocardique

SCINTIGRAPHIE: à l'effort ou avec Persantin ou Dobutamine

TEP avec: Persantin ou Dobutamine

VEUILLEZ NOTER: Votre examen peut être annulé si vous ne suivez pas ces instructions.



Que puis-je manger?

Pendant 24 heures avant votre examen:

- Mangez normalement **SAUF** –
- X Ne consommez PAS** de chocolat ou des produits contenant du chocolat et/ou de cacao.
 - X NE consommez** aucun aliment contenant de la caféine

Pendant 4 heures avant votre examen:

- X Ne mangez RIEN.**
- ✓ Vous pouvez manger un petit déjeuner léger, comme pain grillé/céréals, jusqu'à 4 heures avant votre examen.

Si vous souffrez de diabète de type 1 (insulino-dépendant), veuillez nous aviser pour connaître vos options.



Que puis-je boire?

Pendant 24 heures avant votre examen:

- ✓ **Ne boire que de l'eau.**
- X NE buvez PAS** de café, thé, cola, café décaféiné ou toute autre boisson contenant de la caféine, comprenant boissons énergisantes



Pendant 24 heures avant votre examen:

- X Ne consommez PAS** ou n'utilisez PAS de **cannabis** (marijuana).

Patients de Scintigraphie:

Après votre épreuve d'effort, vous aurez une période de 30 à 45 minutes pour prendre un repas riche en gras. Vous pouvez apporter votre repas ou aller manger à la cafétéria.



Puis-je prendre mes médicaments?

Pendant les 3 jours précédant votre examen:

- X** Veuillez **ARRÊTER** les médicaments suivants pour l'asthme après avoir vérifié avec votre médecin: Aminophylline, Theodur (Theophylline), Uniphyll.

Pendant 48 heures avant votre examen:

- X Ne prenez PAS** de Viagra (Sildenafil), Cialis (Tadalafil), Levitra (Vardenafil).

Pendant 24 heures avant votre examen:

- X Ne prenez PAS d'Aggrenox, Persantin, Agreline.**
- X Ne prenez PAS de médicaments contenant de la caféine tels que:**

-Tout médicaments somnolents	-Lenoltec 1,2,3
-Coupe-faim ou anorexigène	-Midol
-Sinutab avec codéine	-No Doz
-Anacin	-Dristan -222 -Tylenol 1,2,3
-Asacol	-Excedrine -282 -Vanquich
-Darvon	-Fiorinal -292 -Vivarin

Pendant 12 heures avant votre examen:

- X** À moins d'avis contraire de votre médecin, **ne prenez PAS:**

-Imdur (mononitrate d'isosorbide)/ISMN	
-Isordil (dinitrate d'isosorbide)/ISDN	
-NitroDur (timbre de nitroglycérine)	-Nitrong
-Nitropaste	-Transderm -Minitran
-Hydralazine	

Le matin de votre examen:

- X Ne prenez PAS** de Diurétiques.
- ✓ Continuez à utiliser vos comprimés de nitroglycérine ou à vaporiser sous la langue pour soulager la douleur thoracique au besoin. Si possible, discontinuez complètement pour 2 heures avant votre examen.

Patients de Scintigraphie/TEP avec Dobutamine:

Ne pas prendre les bêtabloquants pendant 24 heures avant votre examen (Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol, Atenolol, Sotalol, Labetolol, Acebutalol, Propanolol)

Description de l'examen

Un examen de perfusion cardiaque nécessite deux injections d'une petite quantité de substance radioactive qui évalue l'apport sanguin du muscle cardiaque. Un cathéter intraveineux sera inséré dans votre bras. On vous administrera une injection avant et une autre injection durant votre épreuve d'effort (tapis roulant ou épreuve d'effort sous médicaments). Deux séries d'images, une avant et une autre après votre épreuve d'effort, seront prises à l'aide d'une caméra à scintillation. On vous demandera de vous coucher sur le dos pendant que la caméra prendra une série d'images. Lorsque les deux séries d'images seront terminées, un médecin interprétera les images et un rapport écrit sera envoyé au médecin ayant prescrit l'examen.